

Plan d'intervention pour le verger amateur en bio-dynamie.

Période	Interventions générales	Problèmes spécifiques
Automne	<ul style="list-style-type: none"> • Finir les travaux de cueillette en profitant de la lune ascendante (voir calendrier) • Epanchage du compost mûr, élaboré au printemps avec l'aide des six préparations spécifiques. • Si on ne dispose pas de compost ou que celui-ci n'est pas nécessaire, on pulvérisera en soirée la bouse de corne préparée (500P) ou trois fois de suite le compost de bouse (CBMT par exemple). • 	<ul style="list-style-type: none"> • Après la récolte et avant la chute des feuilles, il est possible de pulvériser une préparation de silice de corne (501), de préférence l'après midi, si cela n'a pas pu être fait avant en raison des conditions climatiques, cela favorise une bonne maturité des bois . • La décoction de prêle pulvérisée à l'automne sur le sol et les troncs est une bonne prévention des cryptogames pour l'année suivante.
Après la chute des feuilles : ces travaux devraient se faire de préférence durant la période de lune descendante (période de plantation)	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimer tous les fruits momifiés et les bois atteints de moniliose • Pulvérisation des arbres et des couronnes avec un enduit liquide à base d'argile, de bouse de vache et de petit lait ou de silicate de soude). (Voir guide pratique) • Badigeon des troncs et de la base des charpentières avec le même type de bouillie épaisse • Planter les nouveaux arbres si le terrain est en bon état (voir fiche spécifique). • 	<ul style="list-style-type: none"> • Si on a eu de grosses attaques de cryptogames (mildiou, oïdium, tavelure, moniliose, cloque etc.) la pulvérisation de silicate de soude à 2% doit précéder la pulvérisation avec l'argile (voir guide) • Si besoin apport de calcaire sous forme de lithothamne à petites doses ou de poudre de roche (basalte) ou encore de calcaire magnésien s'il existe une carence. • Pose de nichoirs
Durant l'hiver	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuivre les opérations de compostage et de plantation en dehors de périodes de gel. • Pratiquer les opérations de taille en période de lune descendante. Appliquer systématiquement sur les plaies de taille, un enduit à base d'argile, de silicate de soude ou de décoction de prêle. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Brûler les bois de taille infectés par les cryptogames le jour du périgée quand le soleil est dans la constellation du verseau épandre les cendres aussitôt dans les zones à protéger
En fin d'hiver Avant le débourrement	<ul style="list-style-type: none"> • Pulvérisation des arbres et des couronnes avec un enduit liquide à base d'argile, de bouse de vache, de petit-lait et de décoction de prêle ou de silicate de soude). (Voir guide pratique) • 	<ul style="list-style-type: none"> • Sur pêcher sensibles à la cloque, le silicate de soude, la bouillie sulfo-calcique et la prêle sont utiles avant débourrement. • Poser des pots de fleur renversés avec de la laine de bois ou de la paille comme refuge pour les auxiliaires.

Au printemps		
débourrement	<ul style="list-style-type: none"> • Au débourrement pulvérisation de décoction de prêle et d'argile à 1%, ou encore de NAB ou de BSC. • On pulvérisera en soirée la bouse de corne préparée (500P) une à deux fois selon l'état du sol et de la végétation après ou en encadrant le débourrement. • 	
Floraison et foliaison	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance des chenilles, des pucerons et des fourmis. • Tisanes et décoctions (en alternance ou associées): • Commencer par l'ortie dès l'apparition des premières feuilles, on peut alterner avec la prêle ensuite. • Poser des pièges à glu pour les fourmis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si des problèmes importants de mouche de la cerise, de l'olivier ou de carpocapse se font sentir, il faut acquérir des pièges spécifiques pour évaluer les populations et les vols et agir en conséquence. • Traitement si nécessaire avec bt sur chenilles (carpo)
Après fleur	<ul style="list-style-type: none"> • Pulvériser la silice de corne (501) plusieurs fois (une à quatre fois) selon les conditions météorologiques et les besoins observés de la plante, dès que les fruits sont formés (taille d'un petit pois pour les cerises et les prunes et taille d'une petite noix pour les pommes et les poires). • Tisanes et décoctions (en alternance ou associées) on peut faire succéder à la tisane d'ortie les tisanes suivantes, dans un rythme hebdomadaire à mensuel selon les besoins : pissenlit, camomille, achillée millefeuille et en cas de problèmes renouveler la décoction de prêle surtout à l'approche de la pleine lune et du périgée de la lune. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Sur vergers et variétés sensibles à la tavelure ou à l'oïdium employer le NAB ou des traitements à base de soufre associé à la tisane de prêle et à l'ortie
été		<ul style="list-style-type: none"> • Eliminer les fruits en surnombre. • Pratiquer la taille en vert durant les périodes de lune descendante (automne lunaire ou période de plantation).
Automne Récoltes		