

LE FRAMBOISIER

Le framboisier a toute sa place dans un potager. Il favorise la pollinisation et ravira vos papilles...

Il produit dès l'année suivant sa plantation.

Conditions de Cultures

Le framboisier pousse sur tous types de sols. Il apprécie particulièrement les sols légers riches en humus et n'aime pas trop le calcaire (néanmoins certaines variétés sont adaptées aux sols calcaires).

Bien que s'accommodant fort bien d'un emplacement à mi-ombre, le framboisiers sera plus productif au soleil et ses fruits seront alors plus sucrés.

Avant la plantation, incorporez au sol entre une (sol riche) et deux (sol pauvre) brouettes de compost mûr pour 10 m² (ou une ou deux pelletées par pied).

Renouvelez cet apport tous les automnes.

Dans les sols pauvres en potasse, un apport modéré (une petite poignée) de cendres de bois pourra être envisagé.

Variétés

On distingue les framboisiers remontants (production en été puis en automne) des framboisiers non remontants (une seule période de production en fin de printemps ou en début d'été selon les variétés).

Telle ou telle variété sera appropriée à votre climat, à votre altitude et à votre sol. Renseignez-vous auprès de votre pépiniériste.

Variétés remontantes :

Augustred (bon arôme, récoltes à partir du mois d'août) ; September (acidulée, récoltes en septembre-octobre), Zeva (gros fruits, récoltes de septembre aux gelées), Héritage (sucrée, récoltes de fin août aux gelées).

Variétés non remontantes :

- Les précoces (récolte en juin) : Lloyd George (délicieuse), Malling Promise (adaptée aux zones montagneuses), Malling Exploit (également adaptée aux zones

montagneuses) :

- Les demi-précoces (récolte début juillet) : Malling Amiral (très bonne, mais ne supporte pas les sols humides), Meeker (sucrée), Frida (délicieuse), Haida (très bonne, à réserver aux sols légers) ;
- Les tardives (récolte en juillet) : Flavi (très bonne), Capitou (adaptée aux sols secs et au calcaire).

Multiplication

Le framboisier se multiplie par séparation de drageons ou bouturages.

Prélèvement des drageons

Les drageons sont des pousses de l'année sur laquelle on conserve une partie du système racinaire.

Pour se faire, en hiver, évacuez la terre autour d'un pied et coupez la racine au sécateur.

Boutures

- Au mois de novembre, prélevez des jeunes rameaux de 1 an.
- Divisiez ces rameaux en boutures de 20 à 30cm (avec au moins 2 yeux)

Plantation

Plantez en ligne distantes de 1m50 environ en espaçant les plants de 60 cm au moins sur la ligne.

Taille

D'une manière générale, la taille consiste à éliminer les rameaux faibles (ne garder que 10 à 15 pousses par mètre linéaire) et les parties ayant fructifié.

La taille est différente selon que les framboisiers sont remontants ou non :

Framboisiers remontants

- Au mois d'août, supprimez à la base les rameaux faibles.
- En hiver, taillez les framboisiers en dessous de la partie ayant fructifié en septembre-octobre.

Framboisiers non-remontants

En hiver, rabattre au raz du sol les rameaux ayant fructifié.

Entretien de la culture

Vous pouvez palisser les cannes sur un fil de fer fixé à 1m20-1m50 (selon la vigueur de la variété) et tendus entre 2 piquets.

Au printemps, désherbez à la main (évitiez absolument le travail du sol avec un motoculteur, vous risqueriez de blesser les racines) puis paillez abondamment.

Supprimez les rejets qui sortent du rang, du moins si vous voulez limiter la propagation des framboisiers dans votre potager.

Protections naturelles

Maladies cryptogamiques

Les champignons à l'origine de maladies sur les framboisiers apparaissent surtout dans les sols lourds. Dans ce cas il est recommandé de traiter préventivement avec une décoction de prêle ainsi qu'avec une décoction de bicarbonate de soude ([voir la page Protections Naturelles des Cultures](#)).

Voici les symptômes des principales maladies cryptogamiques liées aux framboisiers :

La brûlure des dards : apparition de tâche rouge-brun à violet sur les rameaux (en particulier à hauteur des bourgeons), la base des rameaux prenant quant à elle une coloration anormalement claire. Les tissus atteints se déchirent et la pousse se dessèche.

Coupez et brûlez les rameaux atteints.

La fusariose : les feuilles et les extrémités des pousses fructifères jaunissent et fanent rapidement. Les jeunes plants meurent très rapidement.

Si vos framboisiers sont atteints, la variété n'est pas adaptée...choisissez-en une autre !

Ravageurs

2 ravageurs peuvent causer de sérieux dégâts sur les framboisiers...

Le ver des framboisiers : il s'agit d'un coléoptère gris-brun, de forme ovale et mesurant environ 5mm. Ses vols ont lieu en mai-juin et il pond ses œufs sur les fleurs en juin-juillet. Les larves se nymphosent sur l'écorce. Le ver des framboisiers hiverne dans le sol.

Les adultes rongent à peu près toute la plante, des bourgeons aux fruits verts, en passant par les fleurs ou les feuilles...alors que les larves se délectent de la chair des fruits mûrs...

En préventif, il est important de bien couvrir le sol. Vous pouvez également semer des myosotis au pied (effet répulsif).

En cas d'attaque, faites tomber les coléoptères dans un réceptacle et éliminez-les !

Le phytopte de la ronce est un acarien à la peau blanche (pas observable à l'œil nu) hivernant dans l'écorce et sous les bourgeons. En début de végétation, il va sur les feuilles puis sur les boutons et les fleurs. Les fruits des pieds infestés gardent une couleur claire et ne mûrissent pas.

Une couverture du sol avec un compost de feuilles serait efficace en préventif. Pulvérisez également une décoction de tanaisie ([voir sur la page Protections Naturelles des Cultures](#)) après la taille et au début du printemps.

Récoltes

Les fruits se récoltent bien mûrs.

Plantez différentes variétés pour déguster de délicieuses framboises de juin à octobre/novembre...